



TRÁTELO DETÉNGALO

RÁPIDO

EKTERLY es la primera y única terapia oral a demanda que ayuda a detener los ataques de angioedema hereditario (AEH) donde sea que esté.

EDAD
12+

Representación de actores

¿QUÉ ES EKTERLY® (sebetalstat)?

EKTERLY es un medicamento recetado que se usa para tratar ataques repentinos (agudos) de angioedema hereditario (AEH) en adultos y niños de 12 años de edad o más. Se desconoce si EKTERLY es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, inclusive si:


- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si EKTERLY puede causarle daño a un bebé en gestación.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo la [Información para el paciente](#).

Ekterly®
(sebetalstat) tablets 300 mg

Las terapias preventivas solas no eliminan la carga de los ataques de AEH

Los ataques causan alteraciones significativas en la vida de las personas con AEH, lo que requiere que modifiquen sus estilos de vida y rutinas diarias.



14 DOSIS POR AÑO

En un estudio, el 90% de las personas que recibían tratamiento preventivo informaron que aún experimentaban ataques en los últimos 12 meses.

Las terapias inyectables a demanda vienen con su propio conjunto de desafíos.

El tratamiento a demanda es una parte necesaria del manejo del AEH, pero muchas personas que reciben terapia tradicional a demanda a menudo demoran el tratamiento o no tratan los ataques en absoluto.



fue el tiempo promedio que las personas con AEH esperaron para tratar un ataque.*



de las personas con AEH estaban ansiosas cuando anticipaban el uso de inyecciones o infusiones a demanda.†



de las personas con AEH no tratan todos sus ataques, lo que provoca hinchazón y dolor prolongados.†

Una terapia oral a demanda podría cambiar la forma en que se tratan los ataques



Las personas con AEH informaron que tratarían

el 89% DE LOS ATAQUES

SI TUVIERAN UNA OPCIÓN ORAL A DEMANDA‡

El tratamiento oral a demanda tiene el potencial de:



Aumentar la probabilidad de llevar el tratamiento a demanda en todo momento.



Fomentar el tratamiento de todos los ataques tan pronto comienzan los síntomas.



Abordar la ansiedad asociada con los tratamientos inyectables a demanda.



Los tratamientos a demanda pueden detener la progresión del ataque, pero el cuerpo demora en eliminar la hinchazón. El tratamiento lo antes posible puede provocar ataques menos graves y una recuperación más rápida.

*Resultados de una encuesta de la Asociación de HAE de 2023 realizada a 94 personas que recibían tratamiento a demanda o una combinación de tratamiento a demanda y preventivo.

†Resultados de una encuesta de la Asociación de HAE de 2022 realizada a 107 personas que recibían tratamiento a demanda o una combinación de tratamiento a demanda y preventivo.

‡En comparación con el informe de que las personas con AEH solo tratan el 80.3 % de los ataques con las opciones de tratamiento a demanda inyectable actual.

Dé la bienvenida a

Ekterly®

La primera y única terapia
oral a demanda para
AEH que lo acompaña
a donde vaya



Representación de actores

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, inclusive si:

- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si EKTERLY pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras toma EKTERLY.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo la [Información para el paciente](#).

Ekterly®
(sebetralstat) tablets 300 mg

EKTERLY es una **pastilla para tratar ataques de AEH** en adultos y niños a partir de los 12 años de edad



Se puede tomar de inmediato
al reconocer un ataque de AEH.



Está comprobado que detiene la progresión del ataque de manera rápida **y segura, sin agujas ni dolor.**



Es eficaz contra todos los tipos de ataques, ya sea que esté recibiendo terapia preventiva o no.

Es importante saber que los ataques de AEH laríngeos (de garganta) pueden ser potencialmente mortales. Si está experimentando un ataque de AEH en la garganta, tome EKTERLY según las indicaciones y luego diríjase a la sala de emergencias más cercana para recibir atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, inclusive si:

- Tiene problemas hepáticos.



Con **tamaño de bolsillo para facilitar su portabilidad** y sin necesidad de refrigeración, EKTERLY se puede tomar **en cualquier momento** y en cualquier lugar.

Trate sus ataques **tan pronto** reconozca los **síntomas**

Tome una dosis (2 tabletas) por vez. Puede tomarse una segunda dosis después de 3 horas, pero no más de 4 tabletas en un período de 24 horas.



No requiere preparación, montaje ni refrigeración.



EKTERLY puede tomarse **con o sin alimentos**.



Las tabletas están recubiertas con una película para facilitar su ingestión **facilitar su ingestión**.



Cada caja contiene **4 tabletas**.



No se ha informado dificultad para tragarse EKTERLY durante los ataques laríngeos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)


Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar EKTERLY junto con ciertos medicamentos puede causar efectos secundarios o afectar la efectividad de acción de los otros medicamentos. Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma alguno de los siguientes medicamentos, ya que su uso con EKTERLY no está recomendado: itraconazol, fenitoína, efavirenz.

Cómo funciona EKTERLY

La calicreína plasmática es una proteína que desempeña un papel clave en la hinchazón durante los ataques de AEH.

EKTERLY comienza a bloquear la calicreína plasmática **en tan solo**

15 minutos*



En personas con AEH, la calicreína plasmática se vuelve hiperactiva.

Cuando la calicreína plasmática es hiperactiva, hay una filtración excesiva de líquido a través de las paredes de los vasos sanguíneos y hacia los tejidos del cuerpo.

El aumento de la acumulación de líquidos provoca la hinchazón que experimentan las personas con AEH durante un ataque.

EKTERLY trabaja para evitar que los ataques empeoren al bloquear la calicreína plasmática.

*Basado en datos de 600 mg de un estudio de fase 2.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo la [Información para el paciente](#).

EKTERLY detiene los ataques de AEH con rapidez para lograr un alivio rápido de los síntomas

EKTERLY se estudió en un ensayo clínico con 97 adultos y 13 niños (12 años de edad y más) con AEH de tipo I o tipo II.


La mediana de tiempo hasta el inicio del alivio de los síntomas fue de

1.8 horas*
con EKTERLY

vs

6.7 horas
con PLACEBO

Algunas personas que toman EKTERLY comenzaron a experimentar alivio de los síntomas en tan solo 30 minutos.



*El análisis no incluye los ataques en los que no se proporcionó información de respuesta. En la etiqueta del producto, estos ataques se incluyeron como sin respuesta al tratamiento a las 12 horas, con cambio de la mediana a 2.0 horas.




Una opción oral conveniente para tratar sus ataques

El 96% de los ataques que fueron tratados eficazmente con EKTERLY requirieron **solo 1 dosis**.

Funciona para cualquier tipo de ataque

El tiempo que las personas necesitaron para comenzar a sentir alivio después de tomar EKTERLY fue similar, independientemente de lo siguiente:

- Edad (12 años o más)
- Independientemente de si estaban recibiendo o no tratamiento preventivo
- Ubicación y gravedad del ataque



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Conozca los medicamentos que toma. Anótelos para mostrarle la lista a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo la [Información para el paciente](#).

La seguridad de EKTERLY fue similar a la del placebo

EFECTO SECUNDARIO	EKTERLY 600 mg n=93	PLACEBO n=83
Dolor de cabeza, n.º (%)	3 (3.2)	1 (1.2)

- No se informaron efectos secundarios graves relacionados con EKTERLY
- CERO personas abandonaron el estudio clínico debido a efectos secundarios.

Visite [EKTERLY.com/Results](#) para obtener más información sobre el estudio clínico de EKTERLY.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EKTERLY?

Los efectos secundarios más frecuentes de EKTERLY incluyen dolor de cabeza. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Hable con su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Explore los eventos educativos de EKTERLY

Los eventos educativos de EKTERLY están diseñados para ayudar a los pacientes y cuidadores a obtener más información sobre EKTERLY escuchando a profesionales de la salud que tratan el AEH y pacientes que tienen experiencia tomando EKTERLY.

Para reservar su lugar en un próximo evento educativo virtual o en vivo de EKTERLY, visite [EKTERLY.com/Events](#).



Ekterly®
(sebetralstat) tablets 300 mg



KalVista Cares™ es un programa de apoyo al paciente dedicado a garantizar que usted reciba el tratamiento que necesita, cuando lo necesita.

Su próxima dosis ya está al alcance. Desde la inscripción hasta la renovación, estamos con usted en cada paso del camino.

Comprendemos lo difícil que puede ser vivir con AEH; es por eso que nuestros administradores de atención dedicados están aquí para apoyarlo a lo largo de cada paso de su tratamiento.

Al inscribirse, su administrador de atención puede ayudarlo a lo siguiente:



Navegar por la cobertura del seguro y minimizar las demoras en el acceso a EKTERLY.



Trabajar con su farmacia especializada **para asegurarse de recibir su tratamiento.**



Evaluar su elegibilidad para programas de apoyo financiero que puedan ayudar a cubrir el costo de EKTERLY.



Conectarlo con recursos educativos y grupos de apoyo de AEH.



Con el Programa de asistencia de copagos de KalVista Cares, los pacientes elegibles con seguro comercial pueden **pagar tan solo \$0 por EKTERLY***

*Se aplican los términos y condiciones. Visite EKTERLY.com/GettingEKTERLY para obtener más detalles.

Para obtener más información sobre KalVista Cares:

- Visite EKTERLY.com/GettingEKTERLY
- Llame al **1-844-432-3322**

Los administradores de atención están disponibles para ayudarlo de **lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8 p.m., hora del este (ET).**

Pregunte a su médico sobre EKTERLY

¿Está interesado/a en EKTERLY? Programe una cita con su médico para ver si podría ser una opción para usted. Estas son algunas preguntas para comenzar la conversación:

1. Actualmente estoy recibiendo un tratamiento preventivo para el AEH—[¿Sería EKTERLY una buena opción a demanda para mí?](#)
2. Me interesa una terapia oral a demanda para el AEH. [¿Cree que EKTERLY podría ser parte de mi plan de tratamiento?](#)
3. ¿Debo usar EKTERLY para todos mis ataques, [independientemente de la ubicación y la gravedad del ataque?](#)
4. ¿Cómo encasaría EKTERLY en mi vida? [¿Puedo llevarlo conmigo donde quiera que vaya?](#)



El impacto que el AEH tiene en su vida puede cambiar con el tiempo. **Asegúrese de evaluar regularmente su plan de manejo de AEH con su médico y de ajustarlo si es necesario.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Se le recomienda que informe los efectos secundarios relacionados con los productos KalVista al **1-855-258-4782**. Si lo prefiere, puede comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**.



Representación de actores

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo la [Información para el paciente](#).



Notas



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- **Está embarazada o planea quedar embarazada.** Se desconoce si EKTERLY puede causarle daño a un bebé en gestación.
 - **Está amamantando o planea amamantar.** Se desconoce si EKTERLY pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras toma EKTERLY.
 - **Tiene problemas hepáticos.**

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar EKTERLY junto con ciertos medicamentos puede causar efectos secundarios o afectar la efectividad de acción de EKTERLY o de los otros medicamentos. Especialmente informe a su proveedor de atención médica si toma alguno de los siguientes, ya que su uso con EKTERLY no está recomendado: itraconazol, fenitoína, efavirenz. Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de ellos para mostrarle a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EKTERLY?

Los efectos secundarios más frecuentes de EKTERLY incluyen dolor de cabeza. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Hable con su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios relacionados con los productos KalVista al 1-855-258-4782. Si lo prefiere, puede comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo la Información para el paciente.

Ekterly®

(sebetrastat) tablets 300 mg

Una pastilla a demanda para detener los ataques de AEH

TRATAMIENTO TEMPRANO

Puede tomarse inmediatamente después de reconocer un ataque de AEH, para que pueda lograr alivio rápidamente.

EFICACIA CON SOLO 2 TABLETAS

Está comprobado que EKTERLY detiene los ataques de manera rápida y segura sin agujas, sin dolor.

CADA ATAQUE, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

EKTERLY puede tratar cualquier tipo, de ataque, donde sea que esté.

¿QUÉ ES EKTERLY® (sebetralstat)?

EKTERLY es un medicamento recetado que se usa para tratar ataques repentinos (agudos) de angioedema hereditario (AEH) en adultos y niños de 12 años de edad o más. Se desconoce si EKTERLY es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, inclusive si:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si EKTERLY puede causarle daño a un bebé en gestación.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la Información de prescripción completa, incluyendo la Información para el paciente.



Representación de actores

Hable con su médico u obtenga más información en

Ekterly.com

